


Geburtseinleitung: Wann kann sie nötig sein?


Mögliche Gründe¹

- Terminüberschreitung oder Übertragung
- Vorzeitiger Blasensprung
- Schwangerschaftsdiabetes
- Abnorme Fruchtwassermengen
- Unterdurchschnittliches Wachstum des Kindes
- Intrahepatische Schwangerschaftscholestase (Leberfunktionsstörung mit verringertem Gallenabfluss)
- Bluthochdruck in der Schwangerschaft
- Verdacht auf ein zu großes Kind

Was soll eine Geburtseinleitung bewirken?



Wie bereiten sich Gebärmutterhals und Muttermund auf die Geburt vor?



Gebärmutterhals noch nicht verkürzt und Muttermund noch nicht geweitet

Latenzphase: der Muttermund öffnet sich bis zu 6 cm²

Aktive Phase: der Muttermund öffnet sich 6–10 cm²

Der Gebärmutterhals verkürzt sich²

Welche Möglichkeiten der Geburtseinleitung gibt es?

- **Medikamentös¹**

- zur oralen Einnahme
- zur Einführung über die Scheide
- oder als Tropf (Infusion)

- **Mechanisch¹**

- Eipollösung
- Ballonkatheter
- Hygroskopische Dilatatoren


- **Alternativ¹**

- z. B. Rizinusöl

Von Ihrer Ärztin/Ihrem Arzt werden Sie über die möglichen Methoden aufgeklärt.

Im weiteren Verlauf wird regelmäßig kontrolliert:^{1*}

Verkürzung des
Gebärmutterhalses



Einsetzen/Verstärkung
der Wehentätigkeit
(CTG^{**})

Öffnung des Muttermundes

* Die Reife des Gebärmutterhalses bzw. des Muttermundes wird anhand des sogenannten Bishop-Score bestimmt. Hierbei werden die Konsistenz und Weite des Muttermundes, die Lage und Verkürzung des Gebärmutterhalses beurteilt und bewertet. Außerdem wird die Position des Kindes im Becken beurteilt und bewertet.¹

** CTG = Cardiotocography (Englisch) = Kardiotokografie; zur Untersuchung der Wehentätigkeit und des Herzschlags des noch ungeborenen Babys.

Referenzen:

1. DGGG, OEGGG, SGGG. S2k-Leitlinie Geburtseinleitung. Stand Dezember 2020. Addendum vom März 2021.
2. Evbuomwan O, Chowdhury YS. Physiology, Cervical Dilation. StatPearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan. 2023 May 16.