


Doğumun başlatılması


Doğumun başlatılmasına yönelik bilgiler

Gerekli değişiklikler



Doğum esnasında serviks kısalır ve rahim ağzı açılır¹

Oral Misoprostol'ün etki yaklaşımı



ANGUSTA® serviksin kısalmasına ve dolayısıyla rahim ağzının açılmasına neden olabilir.³

Doğumun başlatılması

Doktorlar için bilgiler

Endikasyon	Doğumun başlatılmasına yönelik öneri
Geç doğum (40+0. gebelik haftası ile 41+6. gebelik haftası arası), gebelik devamı (42+0. gebelik haftasından itibaren)	41+0. gebelik haftasından itibaren doğumun başlatılması önerilebilir 41+3. gebelik haftasından itibaren doğumun başlatılması önerilir 42+0. gebelik haftasından itibaren doğumun başlatılması şiddetle önerilir
(Vaktinden önce) erken membran yırtılması (PPROM veya PROM)	37+0 gebelik haftasından itibaren (PPROM)* veya en geç 24 saat sonra (PROM)
Gestasyonel diyabet (GD)	40+0 gebelik haftasından itibaren insüline bağımlı GD tanısında; beslenme ile iyi ayarlanmış GD'de endikasyon yok
İntrahepatik gebelik kolestazı	38+0 gebelik haftasından itibaren; 34+0 gebelik haftasından itibaren önerilen > 100 µmol/l safra asidi konsantrasyonu ile
Hipertansif hastalıklar	Preeklampsi durumunda en geç 37+0 gebelik haftasından itibaren; Gebelik hipertansiyonu durumunda 37+0 gebelik haftasından itibaren; Kronik hipertansiyonda 38+0 gebelik haftasından itibaren; Maternal ve fetal risk tartıldıktan sonra 34+0 gebelik haftasından itibaren de belirtilir.
(Diyabetojenik olmayan) makrozomi şüphesi	LGA fetüs şüphesinde (> 95. persentil) 39+0 gebelik haftasından itibaren

*Amniyotik enfeksiyon sendromu hariç

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe
(Alman Jinekoloji ve Ebelik Derneği) kılavuzundan uyarlanmıştır

Doğum başlatılmadan önce, ortak bir karar alınması amacıyla anne adaylarına tıbbi tavsiye ve danışmanlık verilmelidir.¹

Bishop skoru²

Örnek:

Rahim ağzı 2 cm:	1 puan
%50 kısaltma:	1 puan
Orta yumuşak:	1 puan
Orta:	1 puan
Yükseklik -2:	1 puan

Puan = 5

	Bishop puanı			
	0	1	2	3
Dilatasyon (cm)	<1	1–2	3–4	>4
Uzunluk (cm)	4	2–4	1–2	<1
Tutarlılık	Sabit	Orta	Yumuşak	--
Konum	Posterior	Orta	Anterior	--
Yükseklik	-3	-2	-1/0	>1

(<7 = genç serviks, ≥ 7 = olgun serviks³)

Flynn M., 2015'e göre uyarlanmıştır.²

Referenzen:

1. Geburtseinleitung, Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (S2k, AWMF Registriernummer 015-088, Dezember 2020). <https://www.awmf.org/leitlinien/detail/II/015-088.html>
2. Flynn M. Induction of labour: Chapter 38. 2015. Verfügbar unter: <https://clinicalgate.com/induction-of-labour-2/> (Abgerufen: Juli 2020).
3. ANGUSTA® Fachinformation.

ANGUSTA®, 25 Mikrogramm Tabletten

Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Tablette enthält 25 Mikrogramm Misoprostol. Sonstige Bestandteile: Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Crospovidon Typ B, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid. **Anwendungsgebiete:** Zur Geburtseinleitung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Wenn die Geburt begonnen hat; Bei Verdacht oder Nachweis von fötalen Beeinträchtigungen vor der Geburtseinleitung (z.B. nicht bestandener Non-Stress-Test oder Stress-Test, Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium oder Diagnose oder Anamnese eines beunruhigenden fötalen Zustandes); Wenn Wehen auslösende Arzneimittel und/oder andere Wehen induzierende Substanzen gegeben werden; Bei Verdacht auf, oder Nachweis für eine Uterusnarbe aus früheren Uterus- oder Zervixoperationen, wie z.B. Kaiserschnitt; Wenn eine Uterusanomalie (z.B. Uterus bicornis) vorliegt, die eine vaginale Entbindung nicht möglich macht; Wenn nach der 24. Schwangerschaftswoche eine Placenta praevia oder eine ungeklärte Vaginalblutung auftritt; Wenn eine fötale Lageanomalie auftritt, die eine vaginale Entbindung kontraindiziert; Bei Patienten mit Nierenversagen (GFR <15 ml/min/1,73 m²). **Nebenwirkungen:** Erkrankungen des Nervensystems: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Schwindel, Neonatale Krampfanfälle. Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Neonatale Asphyxie, Neonatale Zyanose. Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts: Sehr häufig: Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Nausea, Erbrechen. Häufig: Diarrhoe; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Nausea, Erbrechen. Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Juckender Ausschlag. Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen: Sehr häufig: Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufig: Uterus-Hyperstimulation; Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Fötale Azidose, vorzeitige Placenta-Ablosung, Uterusruptur. Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort: Häufig: Schüttelfrost, Pyrexie. Untersuchungen: Häufig: mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. Gelegentlich: mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. **Handelsformen:** Doppelschichtige Aluminiumfolien-Blisterpackungen mit 8 Tabletten. Verschreibungspflichtig. Stand 06/2021



ANGUSTA, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe. Alle Bilder dienen nur illustrativen Zwecken.
Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wettenberg,
Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de

ANGUSTA®
(Misoprostol)