

Ihre **Bestellung** bitte an:
Fax-Nr.: 06821-5016521
oder an distributiongermany@norgine.com
Kundenservice Tel.: 0641- 98497210

ANGUSTA® (Misoprostol)

Klinikname/
Name der Krankenhausapotheke:

Ansprechpartner*in:

Straße:

PLZ/Ort:

Telefon:

Kundennummer:

E-Mail:

Angebot gültig bis 30.06.2024
(Es gilt die aktuelle Retouren Regelung.)

Klinikstempel/
Stempel der Krankenhausapotheke

| Produkt | PZN | Packungsgröße und Darreichungsform | Wirkstärke | Wirkstoff | KHAEP* zzgl. MwSt. | Bestellmenge | Summe |
|----------|----------|------------------------------------|------------|-------------|--------------------|--------------|-------|
| ANGUSTA® | 16795817 | 8 Tabletten | 25 µg | Misoprostol | 98,30 € | | € |

*Krankenhausapothekeeinkaufspreis

Mindestbestellwert: 200,00€

- Ja, ich bin einverstanden, dass die Norgine GmbH, Im Westpark 14, 35435 Wetzlar, mir regelmäßig Informationen zu Produkten der Firma Norgine GmbH zuschickt und hierzu meine oben genannten Daten, insbesondere meinen Vor- und Nachnamen sowie meine E-Mail-Adresse speichert und diese zur weiteren Kontaktaufnahme verwendet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit gegenüber der Norgine GmbH widerrufen. Meine Einwilligung ist freiwillig und ich habe das Recht, diese Einwilligung jederzeit durch einfache Nachricht mit Wirkung gegenüber Norgine für die Zukunft ohne Angabe von Gründen zu widerrufen, z.B. an werbewiderspruch@norgine.com. Weiterführende Informationen zur Norgine Datenschutzerklärung finden Sie unter folgendem Link: <https://www.norgine.de/Datenschutzerklaerung>. Norgine verwendet Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns anvertraut haben, stets verantwortungsvoll.

Datum:

Apothekeninhaber*in:

Unterschrift:

ANGUSTA®, 25 Mikrogramm Tabletten

Zusammensetzung: Wirkstoff: Jede Tablette enthält 25 Mikrogramm Misoprostol. **Sonstige Bestandteile:** Hypromellose, Mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Crospovidon Typ B, Croscarmellose-Natrium, hochdisperses Siliciumdioxid

Anwendungsgebiete: Zur Geburtseinleitung. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile; Wenn die Geburt begonnen hat; Bei Verdacht oder Nachweis von fötalen Beeinträchtigungen vor der Geburtseinleitung (z.B. nicht bestandener Non-Stress-Test oder Stress-Test, Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium oder Diagnose oder Anamnese eines beunruhigenden fötalen Zustandes); Wenn Wehen auslösende Arzneimittel und/oder andere Wehen induzierende Substanzen gegeben werden; Bei Verdacht auf, oder Nachweis für eine Uterusnarbe aus früheren Uterus- oder Zervixoperationen, wie z.B. Kaiserschnitt; Wenn eine Uterusanomalie (z.B. Uterus bicornis) vorliegt, die eine vaginale Entbindung nicht möglich macht; Wenn nach der 24. Schwangerschaftswoche eine Placenta praevia oder eine ungeklärte Vaginalblutung auftritt; Wenn eine fötale Lageanomalie auftritt, die eine vaginale Entbindung kontraindiziert; Bei Patienten mit Nierenversagen (GFR <15 ml/min/1,73 m²). **Nebenwirkungen:** **Erkrankungen des Nervensystems:** Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Schwindel, Neonatale Krampfanfälle. **Erkrankungen der Atemwege, des Brustraums und Mediastinums:** Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Neonatale Asphyxie, Neonatale Zyanose. **Erkrankungen des Gastrointestinaltrakts:** Sehr häufig: Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Nausea, Erbrechen. Häufig: Diarrhoe; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Nausea, Erbrechen. **Erkrankungen der Haut und des Unterhautzellgewebes:** Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Juckender Ausschlag. **Schwangerschaft, Wochenbett und perinatale Erkrankungen:** Sehr häufig: Verfärbung des Fruchtwassers durch Mekonium; Mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufig: Uterus-Hyperstimulation; Mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Postpartum Hämorrhagien. Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar: Fötale Azidose, vorzeitige Placenta-Ablösung, Uterusruptur. **Allgemeine Erkrankungen und Beschwerden am Verabreichungsort:** Häufig: Schüttelfrost, Pyrexie. **Untersuchungen:** Häufig: mit 50 Mikrogramm, 4-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. Gelegentlich: mit 25 Mikrogramm, 2-stündlich: Apgar-Score niedrig, Fötale Herzfrequenz anormal. **Handelsformen:** Doppelschichtige Aluminiumfolien-Blisterpackungen mit 8 Tabletten. Verschreibungspflichtig. Stand 06/2021



ANGUSTA, NORGINE und das Norgine-Siegel sind eingetragene Marken der Norgine-Unternehmensgruppe.
Norgine GmbH, Im Westpark 14, D-35435 Wetzlar,
Internet: www.norgine.de, E-Mail: info@norgine.de